微分 微分係数（16問）　版Kの答え

※ 先に f'(x) を求めてから値を入れたかを見てください（f(2) を先に計算して微分すると0になってしまいます）。

---

(1) $f(x) = -4x^2 - 8x - 9$ のとき、

$f'(1)$

-16

(2) $f(x) = 5x^2 + 8$ のとき、

$f'(2)$

20

(3) $f(x) = -2x^2 - x + 8$ のとき、

$f'(3)$

-13

(4) $f(x) = 3x^3 - 9x^2 - 4$ のとき、

$f'(2)$

0

(5) $f(x) = 3x^3 + 3x^2 - 3x + 2$ のとき、

$f'(3)$

96

(6) $f(x) = 3x^2 + x - 4$ のとき、

$f'(2)$

13

(7) $f(x) = -4x^3 + 3x + 4$ のとき、

$f'(1)$

-9

(8) $f(x) = 5x^3 - 8x^2 - 6x - 1$ のとき、

$f'(-1)$

25

(9) $f(x) = -4x^2 - 2x - 9$ のとき、

$f'(-3)$

22

(10) $f(x) = -4x^3 + 9x^2 + 7x + 6$ のとき、

$f'(3)$

-47

(11) $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 3x - 5$ のとき、

$f'(1)$

15

(12) $f(x) = x^3 + 7x^2 - 4x - 8$ のとき、

$f'(0)$

-4

(13) $f(x) = -5x^3 - 8x^2 + 7x - 3$ のとき、

$f'(-2)$

-21

(14) $f(x) = -5x^2 - 9x + 7$ のとき、

$f'(-2)$

11

(15) $f(x) = -5x^2 - 3x - 6$ のとき、

$f'(0)$

-3

(16) $f(x) = -x^3 - 3x - 7$ のとき、

$f'(3)$

-30